

水稻直播特報

～カルパーコーティング～

令和5年4月 日
魚津市
魚津市農業技術者協議会

カルパー直播は、ほ場の準備～は種直後の水管理が出芽・苗立ちに大きく影響します。は種作業を適期に行うため、ほ場の準備は計画的に行いましょう。

1. ほ場の準備 ~耕起から代かきまでの作業はていねいに~

- ①出芽・苗立ちの向上と水管理や雑草防除の効果を高めるため、田面の均平に注意する。
- ②代かきは水を少なめにして行い、稻株や雑草をしっかりすき込む。
代かき～は種までの目安・・・砂壌土2～3日、壤土3～4日、埴壌土4～5日程度

2. は種作業 ~種子や肥料の落下量をチェックする~

- ①は種時期は4月25日～5月10日とし、収穫期
が他の移植などと重ならないよう留意する。
- ②は種量は乾糲で2.5kg～3kg/10aを目安とする。
- ③基肥量は、移植栽培よりチッソ成分で1～2割程度減らす。

コシヒカリ	L P s s 直播コシヒカリ	28～32kg / 10a
-------	-----------------	---------------
- ④は種の3～4時間前から落水し、適度なとろみのある状態で行う。

目標とする苗立本数 $40 \sim 80 \text{ 本/m}^2$ (1m当たり
12～25本程度 (点播:1か所当たり3～4本/株))

3. は種後の水管理 ~田干しの徹底で苗立ちの安定~

- ①は種から5日間程度、土壤表面に亀裂が入るまで田干しを行い、出芽を促進させる。
※田干しを開始して3～4日程度で亀裂が入るほ場は、いったん入水し、ほ場に水がたまつたら、速やかに落水し、乾き過ぎにならないようにする。
- ②田干しが完了したら湛水し、浅水管理(2～3cm程度)に切り替える。

～田干しの目安～

足を踏み入れ、2～3cm程度に沈む頃が入水の目安！

※表面の亀裂が大きすぎると、水がたまりにくくなり、除草剤の効果が低下するので注意する。



- ③除草剤は時期を逃さず、適期に散布しましょう。また散布前に入水し、散布後5日間は湛水してください。

【初期剤】は種後5～7日(入水時)

ベルーガ1キロ粒剤

(1kg/10a)

(※は種直後～ノビエ3葉期 ただし収穫75日前まで)



【体系是正剤】は種後2～3週間

ディオーレ1キロ粒剤(1kg/10a)

または

ディオーレ顆粒(80g/10a)

(※稻1葉期～ノビエ3葉期 ただし収穫90日前まで)