

令和 5年 7月 3日

魚津市
魚津市農業技術者協議会

カメムシ対策緊急特報

6月29日に、雑草地における斑点米カメムシ類の生息密度調査を行ったところ、70.8%(平年:62.4%)と高い割合で確認されました。

また、確認地点での斑点米カメムシ類の平均頭数は、12.7頭(平年:21.5頭)と多めであったことから、ほ場への移動前に草刈りなどを徹底し、斑点米の原因となるカメムシ類の密度低下に努めてください。

●草刈りの実施

斑点米カメムシ類の生息数を抑えるため、「すみか」となる畦畔や雑草地の草刈りを行いましょう。

あわせて、草刈り運動実施期間以降は、雑草の穂が出る前に草刈りや耕起などを行うなど、適切に管理してください。

シロツメクサ

ナギナタガヤ



斑点米カメムシ類が好む雑草!

●草刈り運動について

運動期間 7月1日(土)～7月10日(月)

【注意事項】

- * 草刈りは早朝または夕方の涼しい時を選んで作業を行い、こまめな休憩と水分補給を行い、熱中症の発生防止に努めましょう。
- * 草刈り時は保護具を必ず装着し、農作業安全に十分注意してください。
- * 草刈り時は、周辺の人や車などにも十分注意をしてください。
- * 刈り取った草は、用水に流さないように注意しましょう。
- * 大麦跡田などは草刈り運動期間中に耕起を行い、麦稈や雑草をすきこんでください。