

# 富富富 栽培特報



まもなく、「富富富」の刈取り時期を迎えます。  
適切な水管理、適期刈取りと適正な乾燥調製を行い、  
「胴割米」の発生防止に努め、高品質な「富富富」に  
仕上げましょう。

## 1. 水管理 ～早期落水は行わない～

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力維持と胴割米の発生を防ぎましょう。なお、フェーン現象が予想される場合は、事前に入水しましょう。

## 2. 収穫 ～籾黄化率を確認して、適期に刈り取る～

- ・**籾の黄化率 80%**を目安に、刈取りを開始しましょう。
- ・コシヒカリに比べ、籾の黄化がバラつきやすく、青米の減り方は緩慢ですが、成熟期を過ぎると胴割米が多くなるので、**適期内 (籾黄化率 90%まで) に刈り終えましょう。**
- ・異物混入を防ぐため、ほ場内の雑草の抜き取りやコンバインの清掃を徹底しましょう。



矢印の籾が黄化した時期が適期

- : 黄化
- ▨ : 黄化直前
- : 緑色

**籾黄化率 80%**

### 【刈取り開始時期の目安】

出穂期	刈取始め
8月1日	9月11日頃
8月3日	9月14日頃
8月5日	9月17日頃

## 3. 乾燥調製 ～「過乾燥」による胴割米の発生防止～

- ・乾燥速度は毎時0.8%以内を基本とし、初期の籾水分が高い場合（25%以上）や低い場合（20%未満）は、二段乾燥や送風温度を下げるなど、丁寧な乾燥に努めましょう
- ・青米の混入程度により停止水分を設定しましょう。

### 【乾燥機停止水分の目安】

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く (-0.5%)	変わらない	もどる (+0.5%)

- ・玄米水分は14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう。
- ・1.9mmのふるい目による選別を徹底し、未熟粒の混入を防ぎましょう。