

# 「富富富」栽培特報

魚津「富富富」ブランド化推進協議会

## 1 流通基準・品質目標

～基準を遵守し、高品質で美味しい「富富富」ブランドを確立しよう～

- **流通基準**（基準を満たすものを「富富富」のロゴパッケージで販売）
  - ◎検査等級：1等
  - ◎化学合成農薬の成分使用回数：12以内
- **目標値**
  - ・玄米水分：14.5%～15.0%
  - ・玄米タンパク含有率（水分15%換算値）：6.4%以下

## 2 農薬の成分使用回数

～12成分以内になるよう防除計画を立てよう～

「富富富」栽培管理計画を参考にして防除計画を立てましょう。

基本体系以外の農薬を使用する場合は、事前に営農指導員に相談してください。

### ☆成分使用回数のカウント方法

- ・化学合成農薬に含まれる全ての有効成分をカウントする。
- ・同じ有効成分が複数の農薬に含まれる場合、別々にカウントする。

(例)

剤の区分	薬剤名	有効成分	成分数	考 え 方
苗箱施薬	フェルテラ箱粒剤	クロラントラニプロール	1	クロラントラニプロール 1回
殺菌剤	モンカットラブサイド 20フロアブル	フサライド	1	フサライド 1回
		フルトラニル	1	フルトラニル 1回
殺虫剤	スタークル液剤10	ジノテフラン	1	ジノテフラン 1回
殺虫剤	キラップフロアブル	エチプロール	1	エチプロール 1回
合		計	5	成分使用回数：5回と数える。

※農薬の成分使用回数に、①～⑤に該当する「農薬・成分」は含めません。

- ①微生物農薬（タフブロックなど） ②銅、ボルドー ③カスガマイシン  
④バリダマイシン ⑤スピノサド

## 3 育苗

～健全な苗づくり～

- ・コシヒカリに比べて芽の伸長速度が遅いので、コシヒカリより1～2日長く浸種してください。
- ・ハウスへの搬出直後から積極的な換気を行い、軟弱気味な苗にならないよう管理してください。

#### 4 苗箱施薬剤の散布

～除草剤と間違えないように使用前に袋のラベルを確認～

農薬名	使用方法	対象害虫	成分数
フェルテラ箱粒剤	は種時覆土前～移植当日 50g/箱を育苗箱の上から均一に散布	イネズ、ザウムシ、イネド、ロイムシ、 コメイトウ、ゴブノメイガなど	1

※前年に紋枯病などの病害が発生した場合は、地区担当営農指導員にご相談ください。

#### 5 基肥の施用

～適正な施肥量を施用する～

・基肥チッソ量は、コシヒカリ栽培時の2割減が基準です。


施肥体系	肥料名	施肥量の目安 (kg/10a) (側条)	
		砂壤土	洪積
一発	富富富専用	24～28	20～28
分施	基肥206	20～28	16～30

※発酵鶏ふんなどを春施用した場合や転作跡田では、施用量の目安から、さらに1割程度減肥してください。

#### 6 除草剤の散布

～使用方法を厳守し、適期に散布する～

・初めて「富富富」を作付けする場合は、異品種の漏生苗の抜き取り作業の軽減のため、初期除草剤（マーシエット1キロ粒剤）を散布しましょう。



※初期剤を田植同時処理した場合は、田植え終了後、速やかに入水しましょう。

#### 7 水管理

～適切な水管理に努める～

・「富富富」は、草丈がコシヒカリに比べて短く、深水にすると苗が水没し、徒長しやすくなるとともに、初期分げつの発生が抑制されるので、注意しましょう。