

水稲直播特報

～リゾケアコーティング～

令和8年4月21日
魚津市
魚津市農業技術者協議会

直播は、ほ場の準備～播種直後の水管理が出芽・苗立ちに大きく影響します。播種作業を適期に行うため、ほ場の準備は計画的に行いましょう。

1. ほ場の準備 ～耕起から代かきまでの作業は“しっかりと”～

- ① 出芽・苗立ちの向上と水管理や雑草防除の効果を高めるため、**田面の均平**に注意する。
- ② 代かきは練りすぎ^{*}に注意するとともに、水を少なめに行い、稲株や雑草をしっかりとすき込む。 ※)練りすぎとなると…土中の空気(酸素)が少なくなり、発芽率が低下します。

代かき～播種までの目安・・・砂壤土2～3日、壤土3～4日、埴壤土4～5日程度

2. 播種作業 ～種子や肥料の落下量をチェックする～

- ① 播種時期は4月25日～5月10日とし、収穫期が他の移植などと重ならないよう留意する。
- ② 播種量は乾粒で2.0～3.0kg/10aを目安とする。
(リゾケアコーティング後は1.5倍の重量)
- ③ 基肥量は、移植栽培よりも窒素成分で1～2割程度減らす。

目標とする苗立本数:

60～80本/m²

1m当たり18～25本程度

(点播:1か所当たり3～4本/株)

コシヒカリ | L P s s 直播コシヒカリ 28～32kg/10a

- ④ 播種時はひたひた程度(0.5cm程度)の落水状態とする。

3. 播種後の水管理

- ① 出芽まで湛水(3～5cm、1週間程度)状態を保つ。
- ② 出芽を確認したら、落水して3～7日間程度田干しする。
- ③ 田干し後は移植栽培と同様の水管理を行う。
- ④ 除草剤は時期を逃さず、適期に散布しましょう。また、散布前に入水し、散布後5日間は湛水してください。

【初期剤】播種時～播種直後

ベルーガ1キロ粒剤(1kg/10a)

【体系是正剤】播種後2～3週間

デオレ1キロ粒剤(1kg/10a)

または

デオレ顆粒(80g/10a)

(※稲1葉期～ノビエ3葉期 ただし収穫90日前まで)